

手術(全身麻酔)に伴うピグアナイド系糖尿病薬の休薬について

患者名 _____ 様 (ID _____)

手術予定日 _____ 月 _____ 日 _____ 時

休薬する薬剤名 _____

休薬期間 _____ 月 _____ 日 (朝 昼 夕) ~

★現在内服されている薬剤・糖尿病注射薬及びお薬手帳をお持ちください

休薬の説明

今回の手術は全身麻酔で行います。

あなたが糖尿病の治療のために内服されている上記のお薬はピグアナイド系糖尿病薬と呼ばれています。全身麻酔下での手術の際に脱水に傾くことで、極まれに乳酸アシドーシスという重篤な副作用を発現することがあり、一時的に服用を中止するのが望ましいとされています。

乳酸アシドーシスの症状は初期症状として 筋肉痛 筋肉痙攣 倦怠感 脱力感 腰痛 胸痛 吐き気で進行すると 過呼吸や脱水 低血圧 低体温などの症状が現れることがあります。

万が一の副作用を防止するため、手術の2日前～当日～手術後指示があるまで休薬が必要です。

その一方、休薬により血糖値が上昇する可能性はありますが、入院中は血糖測定を行い、適切に血糖コントロールをさせていただきます。

なお 休薬期間中に高血糖症状があった場合は早急に担当医にお問い合わせ、あるいは受診していただきますようお願いいたします。

問い合わせ先：浅間総合病院 (代表) 0267-67-2295

担当 (_____ 外来 / _____ 病棟)

造影剤使用の検査に伴うビグアイド系糖尿病薬の休薬について

患者名 _____ 様 (ID _____)

検査名 _____

検査予約日 _____ 月 _____ 日 _____ 時

休薬する薬剤名 _____

休薬期間 _____ 月 _____ 日 (朝 昼 夕) ~ _____ 月 _____ 日 (朝 昼 夕) まで

再開日 _____ 月 _____ 日 (朝 昼 夕) から

★お薬手帳をお持ちください

休薬の説明

今回の検査ではヨード造影剤を使用いたします。造影剤とは、病気をよりわかりやすくするために用いられる薬剤で、診断をするために重要なものです。

あなたが糖尿病の治療のために内服されている上記のお薬はビグアイド系糖尿病薬と呼ばれています。ヨード造影剤を使用することにより、極まれに乳酸アシドーシスという重篤な副作用を生じる可能性があるため、検査の2日前～検査当日～検査後2日間の計5日間の休薬が必要です。

乳酸アシドーシスの症状として、筋肉痛 筋肉痙攣 倦怠感 脱力感 吐き気などの症状が現れることがあります。

その一方、休薬により血糖値が上昇する可能性はありますが、通常3～5日の短期間での休薬では急激な血糖上昇は起こりません。

なお 休薬期間中に高血糖症状があった場合は早急に担当医にお問い合わせ、あるいは受診していただきますようお願いいたします。

また再開日については、症状によって変更がありますのでご了承ください。

問い合わせ先：浅間総合病院 (代表) 0267-67-2295

担当 (_____ 外来 / _____ 病棟)